Exame de Ingresso Unificado das Pós-graduações em Física

CCNH(UFABC), DFUFPR(UFPR), IFGW(UNICAMP), IFSC(USP) IFT(UNESP), IFUSP(USP), PG/FIS(ITA), PPGF(UFSCAR)

2º Semestre/2009

Parte $1 - \frac{14}{4} / 2009$

Instruções

- NÃO ESCREVA O SEU NOME NA PROVA. Ela deverá ser identificada apenas através do código (EUFxxx).
- Esta prova constitui a **primeira parte** do exame de ingresso à Pós-Graduação em Física das seguintes Instituições:

CCNH(UFABC), DFUFPR(UFPR), IFGW(UNICAMP), IFSC(USP) IFT(UNESP), IFUSP(USP), PG/FIS(ITA), PPGF(UFSCAR).

Ela contém problemas de

Mecânica Clássica, Física Moderna e Termodinâmica e Mecânica Estatística. Todas as questões têm o mesmo peso.


- O tempo de duração dessa prova é de **4 horas**. O tempo mínimo de permanência na sala é de **90 minutos**. Procure fazer todos os problemas.
- NÃO é permitido o uso de calculadoras ou outros instrumentos eletrônicos.
- Resolva cada questão na página correspondente do caderno de respostas. As folhas serão reorganizadas para a correção. Se precisar de mais espaço, utilize as folhas extras do caderno de respostas. Não esqueça de escrever nas folhas extras o número da questão (Q1, ou Q2, ou ...) e o seu código de identificação (EUFxxx). Folhas extras sem essas informações não serão corrigidas.

Use uma folha extra diferente para cada questão. Nao destaque a folha extra.

- Se precisar de rascunho, use as folhas indicadas por RASCUNHO, que se encontram no fim do caderno de respostas. NÃO AS DESTAQUE. As folhas de rascunho serão descartadas e questões nelas resolvidas não serão consideradas.
- NÃO escreva nada no formulário; DEVOLVA-O ao fim da prova, pois ele será utilizado amanhã.

Boa prova!

- Q1. Um disco uniforme, de seção reta circular de raio R, massa M e momento de inércia I (com relação ao eixo perpendicular ao plano do disco e que passa pelo seu centro), encontra-se preso a uma mola de constante k, massa desprezível e um certo comprimento de repouso, como é mostrado na figura abaixo. O disco rola sobre a superfície sem deslizar e seu movimento está confinado ao plano da figura.
 - 1. Escreva a equação para a energia mecânica do sistema em função da velocidade do centro de massa e da distensão da mola.
 - 2. Obtenha a equação de movimento para o centro de massa do disco.
 - 3. Determine a frequência angular de oscilação do centro de massa do disco.



- Q2. Uma partícula de massa m move-se em um potencial $V(r) = -C/(3r^3)$, sendo C uma constante positiva. Considere que a partícula possua momento angular L diferente de zero.
 - 1. Escreva a equação para a energia mecânica da partícula em termos da distância r à origem, da sua derivada temporal \dot{r} , do momento angular L, da massa m e da constante C.
 - 2. Considerando os termos que só dependem de r na energia mecânica como um potencial efetivo $V_{ef}(r)$, esboce o grafico de $V_{ef}(r)$.
 - 3. Existem órbitas circulares para essa partícula? Em caso afirmativo, determine o raio de cada uma dessas possíveis órbitas e discuta a estabilidade das mesmas.
 - 4. Calcule a energia mecânica mínima, E_{min} , acima da qual a partícula vinda do infinito é capturada pelo potencial, ou seja, não retorna mais para o infinito.
- Q3. (a) As seguintes afirmações referem-se ao efeito fotoelétrico. Responda Verdadeiro (V) ou Falso (F) e justifique brevemente a sua resposta (máximo de três linhas). Respostas sem justificativas ou com justificativas erradas não serão consideradas. Responda na folha de Respostas.
 - 1. Incide-se luz num material fotoelétrico e não se observa a emissão de elétrons. Para que ocorra a emissão de elétrons no mesmo material basta que se aumente suficientemente a intensidade da luz incidente.
 - 2. Incide-se luz num material fotoelétrico e não se observa a emissão de elétrons. Para que ocorra a emissão de elétrons no mesmo material basta que se aumente suficientemente a frequência da luz incidente.
 - 3. No contexto do efeito fotoelétrico, o potencial de corte é a tensão necessária para deter os elétrons que escapam do metal com a menor velocidade possível.

- 4. Quando luz azul incide sobre uma placa de zinco, ela não produz efeito fotoelétrico, mas quando iluminada com luz vermelha ocorre emissão de elétrons.
- 5. Quanto maior for a frequência da luz incidente, maior será a energia cinética dos elétrons emitidos.
- (b) Considere o efeito fotoelétrico inverso, ou seja, a emissão de fótons em consequência do bombardeio de um material com elétrons de alta velocidade. Calcule a frequência máxima que podem ter os fótons emitidos se a superfície é bombardeada com elétrons com velocidade c/2, onde c é a velocidade da luz.
- Q4. A energia da radiação de corpo negro, por unidade de volume e por unidade de intervalo de frequência, é dada por:

$$u_{\nu}(\nu) = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{e^{h\nu/k_B T} - 1} ,$$

onde ν representa a frequência do fóton e T a temperatura da radiação.

- 1. Deduza a expressão para a energia total E de um gás de fótons em um volume V. Qual é a dependência de E com a temperatura?
- 2. Esboce gráficos de $u_{\nu}(\nu)$ para duas temperaturas T_1 e T_2 , sendo $T_1 < T_2$.
- 3. Escreva as formas assintóticas de $u_{\nu}(\nu)$ no caso de frequências muito altas (lei de radiação de Wien) e no caso de frequências muito baixas (lei de radiação de Rayleigh-Jeans).
- 4. Imagine que o Universo seja uma cavidade esférica de paredes impenetráveis e raio 10^{28} cm, contendo um gás de fótons em equilíbrio térmico. Se a temperatura dentro da cavidade for de 3 K, estime a quantidade de energia contida nessa cavidade.
- 5. Supondo que o Universo se expanda adiabaticamente, calcule a temperatura que ele terá quando o seu volume for o dobro do valor atual (a entropia do gás de fótons é $S \propto VT^3$).
- Q5. Considere um sistema de N átomos localizados e não interagentes. Cada átomo pode estar em um dos três estados quânticos rotulados pelo número quântico k, com k=-1, 0, 1. Um átomo tem a mesma energia $\varepsilon_1 > 0$ no estado k=1 ou no estado k=-1. Um átomo no estado k=0 tem energia $\varepsilon_0 = 0$. Determine:
 - 1. A função de partição do sistema.
 - 2. A probabilidade p_0 de um átomo se encontrar no estado com energia 0. Determine o comportamento de p_0 nos limites de altas e baixas temperaturas e esboce o gráfico de p_0 versus T.
 - 3. As expressões para a energia interna e para a entropia como função da temperatura T. Determine os valores assintóticos da energia e da entropia nos limites de altas e baixas temperaturas. A terceira lei da termodinâmica é observada?
 - 4. Esboce o gráfico da entropia como função da temperatura.

Exame de Ingresso Unificado das Pós-graduações em Física

CCNH(UFABC), DFUFPR(UFPR), IFGW(UNICAMP), IFSC(USP) IFT(UNESP), IFUSP(USP), PG/FIS(ITA), PPGF(UFSCAR)

2º Semestre/2009

Parte 2 - 15/4/2009

Instruções

- NÃO ESCREVA O SEU NOME NA PROVA. Ela deverá ser identificada apenas através do código (EUFxxx).
- Esta prova constitui a **segunda parte** do exame de ingresso à Pós-Graduação em Física das seguintes Instituições:

CCNH(UFABC), DFUFPR(UFPR), IFGW(UNICAMP), IFSC(USP) IFT(UNESP), IFUSP(USP), PG/FIS(ITA), PPGF(UFSCAR).

Ela contém problemas de

Eletromagnetismo, Mecânica Quântica e Termodinâmica e Mecânica Estatística. Todas as questões têm o mesmo peso.

- O tempo de duração dessa prova é de **4 horas**. O tempo mínimo de permanência na sala é de **90 minutos**. Procure fazer todos os problemas.
- NÃO é permitido o uso de calculadoras ou outros instrumentos eletrônicos.
- Resolva cada questão na página correspondente do caderno de respostas. As folhas serão reorganizadas para a correção. Se precisar de mais espaço, utilize as folhas extras do caderno de respostas. Não esqueça de escrever nas folhas extras o número da questão (Q6, ou Q7, ou ...) e o seu código de identificação (EUFxxx). Folhas extras sem essas informações não serão corrigidas.

Use uma folha extra diferente para cada questão. Nao destaque a folha extra.

- Se precisar de rascunho, use as folhas indicadas por RASCUNHO, que se encontram no fim do caderno de respostas. NÃO AS DESTAQUE. As folhas de rascunho serão descartadas e questões nelas resolvidas não serão consideradas.
- NÃO é necessário devolver o Formulário.


Boa prova!

Q6. No instante inicial t = 0, uma partícula de massa m e carga q encontra-se na posição $x_0\hat{x}$ e com velocidade $v_0\hat{y}$. Os campos de força agindo sobre a partícula são devidos somente ao potencial elétrico ϕ e ao potencial vetor \vec{A} , dados por

$$\begin{split} & \Phi(\vec{r}) &= \alpha_0 x + a \alpha_1 \; , \\ & \vec{A}(\vec{r}) &= \frac{\beta_0}{2} (\hat{z} \times \vec{r}) + a \; \beta_1 \; \hat{u} \; e^{\hat{u} \cdot \vec{r}/a} \; , \end{split}$$

onde $\alpha_0, \, \alpha_1, \, a, \, \beta_0$ e β_1 são constantes reais e \hat{u} é um versor constante e real.

- 1. Calcule o vetor campo elétrico em todo o espaço, $\vec{E}(\vec{r})$.
- 2. Determine o vetor indução magnética em todo o espaço, $\vec{B}(\vec{r})$.
- 3. Existe algum valor para a velocidade inicial v_0 tal que a trajetória da partícula seja uma reta? Em caso afirmativo, calcule-o.
- Q7. Durante uma tempestade, uma nuvem cobre a cidade de São Paulo a uma altura h=500 m em relação ao solo. Vamos supor que a largura da nuvem seja bem maior que essa altura h. Um balão meteorológico equipado com um sensor de campo elétrico é então lançado verticalmente a partir do solo. Os dados coletados pelo sensor estão ilustrados na figura abaixo, onde E(z) é o m'odulo do campo elétrico em função da altitude (z=0 no solo). A espessura da nuvem na direção vertical é igual a 1200 m e sabe-se que a densidade de carga elétrica é sempre negativa no seu interior.
 - 1. Indique, em um diagrama, a direção e sentido do campo elétrico nas regiões abaixo, dentro e acima da nuvem.
 - 2. Calcule a densidade volumétrica de carga na atmosfera em função da altitude, $\rho(z)$, e esboce o seu gráfico.
 - 3. Para quais valores de z o potencial elétrico é máximo ou mínimo? Calcule o potencial elétrico nesses pontos? Tome V=0 no solo.



Q8. Responda as questões abaixo o mais detalhadamente possível. Não deixe nada indicado. Conclua.

Considere um operador hermitiano H e mostre que:

- 1) os autovalores de H são necessariamente reais;
- 2) os autovetores de H correspondentes a autovalores diferentes são ortogonais.

Um operador A, que corresponde ao observável a, tem dois autoestados normalizados, $|\varphi_1\rangle$ e $|\varphi_2\rangle$, com autovalores a_1 e a_2 , respectivamente, e $a_1 \neq a_2$. Um outro operador B, que corresponde ao observável b, tem dois autoestados normalizados, $|\chi_1\rangle$ e $|\chi_2\rangle$, com autovalores b_1 e b_2 , respectivamente, e $b_1 \neq b_2$. Os dois conjuntos de autoestados (ou bases) estão relacionados por:

$$|\varphi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}}(|\chi_1\rangle + 3|\chi_2\rangle) \quad e \quad |\varphi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}}(3|\chi_1\rangle - |\chi_2\rangle).$$

3) Encontre a relação inversa entre as bases, ou seja, os $|\chi\rangle$ s em termos dos $|\varphi\rangle$ s.

Sobre esse sistema, podem ser feitas medidas em sequência. Calcule as probabilidades pedidas nos casos abaixo:

- 4) a é medido e é encontrado o autovalor a_1 . Imediatamente após, b é medido e é encontrado o autovalor b_1 . Em seguida, a é medido novamente. Qual é a probabilidade de se obter novamente o autovalor a_1 nessa última medida?
- 5) a é medido e é encontrado o autovalor a_1 . Após essa medida de a, mede—se b e novamente a, nessa ordem. Qual é a probabilidade de se obter nessa sequência de medidas os autovalores b_1 (na medida de b) e a_1 (na medida de a)?
- Q9. Sendo a energia potencial de um sistema quântico unidimensional dada por um poço quadrado infinito,

$$V(x) = \begin{cases} 0, & \text{para } 0 \le x \le L, \\ \infty, & \text{em outro caso}, \end{cases}$$
 (1)

1) encontre os autovalores da energia e suas respectivas autofunções, indicando as condições de contorno que estas devem obedecer. OBS.: Não é necessário normalizar as autofunções; suponha que a constante de normalização de cada estado (n) é conhecida e vale N_n .

A esse sistema é acrescentada uma perturbação da forma:

$$\Delta V(x) = a \,\delta(x - L/2) \,, \tag{2}$$

onde $\delta(x-x_0)$ é a função delta de Dirac e a uma constante real.

- 2) Todos os níveis de energia são afetados por essa perturbação? Se a resposta for negativa, o que caracteriza os níveis que são e os que não são afetados? Como diferenciá—los? Explique.
- 3) Calcule a correção aos níveis de energia em primeira ordem em teoria de perturbação.
- Q10. Um mol de um gás ideal percorre um ciclo formado por uma expansão adiabática $(1 \to 2)$, uma transformação isobárica $(2 \to 3)$ e uma transformação isocórica $(3 \to 1)$. Considere dados $V_1, V_2, P_3, C_V, \gamma$ e R. Em uma transformação adiabática não há troca de calor; em uma transformação isobárica a pressão P é mantida constante e em uma transformação isocórica o volume V é mantido constante.

- 1. Esboce o ciclo no diagrama P-V.
- 2. Determine o calor trocado e o trabalho realizado em cada trecho do ciclo.
- 3. Ache o rendimento η de um motor que opera segundo esse ciclo em termos de V_1 e $V_2.$
- $4.\,$ Encontre a variação de entropia em cada trecho do ciclo.